

		<p style="text-align: center;">A.R.S.I.A. (Agenzia regionale sviluppo e innovazione in agricoltura) E.N.S.E (Ente Nazionale Sementi Elette)</p>	<p style="text-align: center;">REGIONE TOSCANA</p> 
---	---	---	---

Pomodoro: scheda descrittiva

Plantula: pigmentazione antocianica dell'ipocotile	1. assente
	9. presente
Pianta: tipo di accrescimento	1. determinato
	2. indeterminato
Foglia: divisione del lembo	1. pennato
	2. bipennato
Foglia: tipo	1. tipo 3
	2. tipo 5
	3. tipo 7
Fiore: pubescenza dello stilo	1. assente
	9. presente
Frutto: taglia	1. molto piccola
	2. da molto piccola a piccola
	3. piccola
	4. da piccola a media
	5. media
	6. da media a grande
	7. grande
	8. da grande a molto grande
	9. molto grande
Frutto: forma	1. appiattita
	2. leggermente appiattita
	3. arrotondata
	4. arrotondata allungata
	5. cuoriforme
	6. allungata cilindrica
	7. allungata piriforme
	8. allungata pruniforme
	9. rettangolare
Frutto: costolatura della parte pedunculare	1. assente
	9. presente
Frutto: intensità della costolatura	3. lieve
	4. da lieve a media
	5. media

	6. da media a forte
	7. forte
Frutto: sezione trasversale	1. tondeggiate
	2. angolata
	3. irregolare
Frutto: numero di logge	1. due
	2. due e tre
	3. tre
	4. tre e quattro
	5. più di quattro
Frutto: colletto (ante maturazione)	1. assente
	9. presente
Frutto: colore verde (ante maturazione)	3. chiaro
	4. da chiaro a medio
	5. medio
	6. da medio a scuro
	7. scuro
Frutto: colore (a maturazione)	1. giallo
	2. arancio
	3. rosa
	4. vermiglio
	5. cremisi
	6. rosso-bruno
Frutto: colore dell'epidermide	1. incolore
	2. giallo
Frutto: colore della polpa	1. giallo
	2. rosso
	3. cremisi
	4. arancio
Epoca di fioritura (3° fiore 2 ^a infiorescenza)	3. precoce
	4. da precoce a media
	5. media
	6. da media a tardiva
	7. tardiva
Epoca di maturazione	3. precoce
	4. da precoce a media
	5. media
	6. da media a tardiva
	7. tardiva
Resistenza: Verticillium spp.	1. assente
	9. presente

Resistenza:	1. assente
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici razza 0	9. presente
Resistenza:	1. assente
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici razza 1	9. presente


SCHEDA GRAFICA

Pomodoro – *Lycopersicon lycopersicum* L. Kanten ex. Farw.

Foglia: dimensione delle foglioline (nel mezzo della foglia)




Foglia: portamento del picciolo della fogliolina in relazione all'asse principale



Fiore: pubescenza dello stilo


Alcune varietà glabre possono presentare alcuni rari e piccoli peli alla base dello stilo

Abscissione del nodo del peduncolo




Alcune varietà che hanno soltanto un lieve collare al posto della abscissione del nodo (eterozigote per il gene che controlla la presenza del segmento) sono considerate senza segmento.

Solo per le varietà con abscissione del nodo: Peduncolo: lunghezza (dall'abscissione del nodo al calice)




corta	3	7-9 mm
media	5	9-14 mm
linga	7	14-18 mm

Frutto: forma in sezione longitudinale




1

appiattita




2

leggermente appiattita




3

rotonda



4

rettangolare




5

cilindrica




6

ellittica




7

cuoriforme



8

obovata



9


ovata



10

periforme

Frutto: depressione alla base del peduncolo




1
assente
o molto
debole

3
debole

5
media

7
forte

Frutto: forma della parte terminale



1
dentata

2
da dentata
a piatta

3
piatta

4
da piatta
ad appuntita

5
appuntita

Frutto: compattezza

Metodo:

Stadio di raccolta: i frutti devono essere raccolti a completa colorazione

Determinazione della compattezza:

Si determina a mano la compattezza dei frutti confrontandoli con lo standard varietale.