



2- PORRO



(*Allium porrum* L.)


Scheda descrittiva morfologica

La descrizione dei caratteri indicati nella prima colonna con GIBA è raccomandata dal Gruppo di lavoro Biodiversità Agricola. La descrizione dei caratteri n. **5, 6, 10, 11, 14, 17**, indicati nella seconda colonna con asterisco (*) è obbligatoria ai fini dell'iscrizione al Catalogo delle "varietà da conservazione".

| N° GIBA | N° CPVO/ UPOV | CARATTERE | LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE | VARIETA' DI RIFERIMENTO | |
|--|---------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 1 (a) | PIANTA: altezza | 1 | molto bassa | De Carentan 2 |
| | | | 3 | bassa | D'Hiver de Saint Victor |
| | | | 5 | media | Bleu de Solaise |
| | | | 7 | alta | Kingston, Long géant du Verdet |
| | | | 9 | molto alta | Bulgaarse Reuzen |
|  | | | | | |
| 2 | 2 (a) | FOGLIAME: portamento | 1 | eretto | Rese |
| | | | 3 | semieretto | Linx, Upton |
| | | | 5 | orizzontale | De Carentan 2, D'Elbeuf, Jaune gros du Poitou |
|  | | | | | |

| N° GIBA | N° CPVO/ UPOV | CARATTERE | LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE | VARIETA' DI RIFERIMENTO | |
|---------|---------------|---|-------------------------------------|-------------------------|--|
| 3 | 3 (b) | LEMBO FOGLIARE: curvatura | 3 | debole | Bell, Lampton |
| | | | 5 | media | Flextan, Linx |
| | | | 7 | forte | Blauwgroene Winter, Bulgaarse Reuzen |
| | | | | | |
| 4 | 4 (b) | LEMBO FOGLIARE: lunghezza del lembo più lungo | 3 | corto | Artemis, Conora, De Carentan 2, D'Elbeuf, Kalmar |
| | | | 5 | medio | Flextan, Porridor, Rese |
| | | | 7 | lungo | Kingston, Kong Richard, Maxim |
| 5 GIBA | 5 (*) (b) | LEMBO FOGLIARE: larghezza del lembo più lungo | 3 | stretto | Lampton, Rustic |
| | | | 5 | medio | De Liège |
| | | | 7 | largo | Jaune gros du Poitou, Rese, Striker |
| | | | | | |
| 6 GIBA | 6 (*) (b) | LEMBO FOGLIARE: colore | 1 | verde giallastro | Jaune gros du Poitou |
| | | | 2 | verde | Premier |
| | | | 3 | verde grigiastro | Zwitserse Reuzen |
| | | | 4 | verde bluastrò | Blauwgroene Winter, Libertas, Olaf, Porridor |
| 7 | 7 (b) | LEMBO FOGLIARE: intensità del colore | 3 | chiaro | |
| | | | 5 | medio | |
| | | | 7 | scuro | |
| 8 | 8 (b) | LEMBO FOGLIARE: pigmentazione antocianica (da osservare dopo un periodo di gelate notturne) | 1 | assente o molto lieve | Jaune gros du Poitou |
| | | | 3 | lieve | Azur |
| | | | 5 | media | |
| | | | 7 | forte | Nepal |
| | | | 9 | molto forte | D'Hiver de Saint Victor |

| N° GIBA | N° CPVO/ UPOV | CARATTERE | LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE | VARIETA' DI RIFERIMENTO | |
|--|---------------|---|-------------------------------------|-------------------------|---|
| 9 | 9 (b) | LEMBO FOGLIARE: glaucescenza | 1 | assente o molto lieve | Jaune gros du Poitou, Kingston |
| | | | 3 | lieve | Carlton, Gros long d'été 2, Rese |
| | | | 5 | media | D'Elbeuf, Linx |
| | | | 7 | forte | Bleu de Solaise, Flextan |
| | | | 9 | molto forte | |
| 10 GIBA | 10 (*) (c) | PIANTA: lunghezza (misurata su pianta raccolta con le foglie più lunghe allineate con il fusto) | 1 | molto corta | |
| | | | 3 | corta | De Carentan 2 |
| | | | 5 | media | Bleu de Solaise, Jaune gros du Poitou |
| | | | 7 | lunga | Kingston, Rese, Titan |
| | | | 9 | molto lunga | Bulgaarse Reuzen |
|  | | | | | |
| 11 GIBA | 11 (*) (c) | FUSTO: lunghezza | 1 | molto corto | |
| | | | 3 | corto | Artemis, Bleu de Solaise, D'Hiver de Saint Victor |
| | | | 5 | medio | Gros long d'été 2 |
| | | | 7 | lungo | Lampton, Maxim |
| | | | 9 | molto lungo | Kingston Kong, Richard |
| 12 GIBA | 12 (c) | FUSTO: diametro (a metà lunghezza) | 1 | molto piccolo | |
| | | | 3 | piccolo | Lampton, Titan |
| | | | 5 | medio | Géant précoce |
| | | | 7 | grande | Premier, Zwitserse Reuzen |
| | | | 9 | molto grande | Jaune gros du Poitou |
|  | | | | | |
| 13 | 13 (c) | FUSTO: rapporto lunghezza/diametro | 3 | basso | D'Hiver de Saint Victor |
| | | | 5 | medio | Easton, Gros long d'été 2 |
| | | | 7 | alto | Bulgaarse Reuzen |
|  | | | | | |

| N° GIBA | N° CPVO/ UPOV | CARATTERE | LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE | VARIETA' DI RIFERIMENTO | |
|--|---------------|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 14 GIBA | 14 (*)(c) | FUSTO: formazione del bulbo | 1 | assente o molto debole | Jolant, Roxton, Striker |
| | | | 3 | debole | Hafnia, Lampton, Linx, Titan |
| | | | 5 | media | Bleu de Solaise, Premier |
| | | | 7 | forte | Artemis, Jaune gros du Poitou |
| | | | 9 | molto forte | Carentan 2 |
| 15 | 15 (c) | FUSTO: restringimento verso la base | 1 | assente | Herfstreuzen 2 |
| | | | 9 | presente | D'Elbeuf |
|  | | | | | |
| 16 | 16 | <u>SOLO VARIETA' A MOLTIPLICAZIONE VEGETATIVA:</u> SCAPO: lunghezza | 3 | corto | |
| | | | 5 | medio | |
| | | | 7 | lungo | |
| <p>Osservazione da effettuare su scapo verde, completamente sviluppato, prima che inizi ad aprirsi e disseccarsi.</p>  | | | | | |
| 17 GIBA | 17 (*)(*) | <u>SOLO VARIETA' A MOLTIPLICAZIONE VEGETATIVA</u> FIORE: sterilità maschile | 1 | assente | |
| | | | 9 | presente | |
| <p>Carattere da osservare a completa fioritura strofinando delicatamente un foglio di carta nera sulla testa dell'infiorescenza: se la varietà è sterile non si vedrà polline sulla carta. In varietà maschio-sterili le antere sono vuote e seccano molto velocemente.</p> | | | | | |
| <p>Note</p> <p>(a) Le osservazioni vanno eseguite quando i lembi fogliari più esterni entrano in senescenza. (b) Le osservazioni del lembo vanno effettuate sulla foglia completamente sviluppata. (c) Le osservazioni vanno eseguite a maturità commerciale.</p> | | | | | |