


## 35- MELANZANA


(*Solanum melongena* L.)

### Scheda descrittiva morfologica


La descrizione dei caratteri indicati nella prima colonna con GIBA è raccomandata dal Gruppo di lavoro Biodiversità Agricola. La descrizione dei caratteri n. **16, 18, 19, 24, 28, 40**, indicati nella seconda colonna con asterisco (\*) è obbligatoria ai fini dell'iscrizione al Catalogo delle "varietà da conservazione".


N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE		VARIETA' DI RIFERIMENTO
1 GIBA	1	PLANTULA: pigmentazione antocianica dell'ipocotile	1	assente	Listada de Gandia
			9	presente	Baluroi, Bonica
2	2	PLANTULA: intensità della pigmentazione antocianica dell'ipocotile	1	molto debole	Whitegg
			3	debole	Bonica
			5	media	Baluroi
			7	forte	Larga Morada
			9	molto forte	
3 GIBA	3 (a)	PIANTA: portamento	1	eretto	Baluroi, Pingtung Long, Purpura Violetta Lunga 2
			3	semieretto	Bonica, Ovana
			5	orizzontale	Black Bell, Irene, Listada de Gandia, Slim Purple
4	4 (a)	PIANTA: altezza	1	molto bassa	
			3	bassa	Adona, Monstrueuse de New York, Whitegg
			5	media	Short Tom, Tudela
			7	alta	Avan, Baluroi
			9	molto alta	Nilo
5	5 (a)	STELO: distanza tra i cotiledoni ed il nodo del primo fiore	1	molto corta	Ova
			3	corta	Dourga
			5	media	Bonica
			7	lunga	De Barbentane
			9	molto lunga	Nilo
6 GIBA	6 (a)	STELO: pigmentazione antocianica	1	assente	Whitegg
			9	presente	Baluroi

N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE		VARIETA' DI RIFERIMENTO
7	7 (a)	STELO: intensità della pigmentazione antocianica	1	molto debole	
			3	debole	Bonica
			5	media	Baluroi
			7	forte	Redonda de Valencia, Short Tom
			9	molto forte	
8	8 (a)	STELO: pubescenza	3	debole	Baluroi, Black Oval
			5	media	Abrivado, Bonica
			7	forte	Bolan, Estival, Mistral
9	9 (a)	LEMBO FOGLIARE: taglia	1	molto piccolo	
			3	piccolo	Short Tom
			5	medio	Baluroi
			7	grande	Bonica
			9	molto grande	Morisca
10	10 (a)	LEMBO FOGLIARE : sinuosità del margine	1	assente o molto debole	Baluroi, Bonica
			3	debole	Adria
			5	media	Epic, Fabiola
			7	forte	Dalia, Niteking, Tosca
			9	molto forte	
<p>La sinuosità del margine rappresenta una tipologia di lobatura che non si spinge fino alla nervatura principale ma deriva da un'incisione del margine della foglia. Essa non implica l'ondulazione del margine.</p>					
					
11	11 (a)	LEMBO FOGLIARE : bollosità	1	assente o molto debole	Baluroi
			3	debole	Ritmo
			5	media	Bonica
			7	forte	Oria
			9	molto forte	
12	12 (a)	LEMBO FOGLIARE: intensità del colore verde	3	chiaro	Black Beauty
			5	medio	Baluroi, Bonica
			7	scuro	Purpura, Short Tom
13	13	INFIORESCENZA: numero di fiori	1	da uno a tre	
			2	più di tre	Whitegg
14	14	FIORE: taglia	3	piccola	Cima viola
			5	media	Violetta di New York
			7	grande	Prosperosa

N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE		VARIETA' DI RIFERIMENTO
15	15	FIORE: intensità del colore porpora	3	chiaro	Listada de Gandia
			5	medio	Baluroi
			7	scuro	Redonda Negra
16 GIBA	16 (*)(b)	FRUTTO: lunghezza	1	molto corto	Whitegg
			3	corto	Birgah
			5	medio	Cava
			7	lungo	Mistral
			9	molto lungo	Indira, Slim Purple
17	17 (b)	FRUTTO: diametro massimo	1	molto piccolo	Slim Purple, Whitegg
			3	piccolo	Mistral, Indira
			5	medio	Cava
			7	grande	Bonica
			9	molto grande	Birgah
18 GIBA	18 (*)(b)	FRUTTO: rapporto lunghezza/diametro massimo	1	molto basso	Birgah, Kermit
			3	basso	Bonica
			5	medio	Cava
			7	alto	Mistral
			9	molto alto	Indira, Slim Purple
19 GIBA	19 (*)(b)	FRUTTO: forma generale	1	globosa	Kermit, Purpura, Violetta di New York
			2	ovoidale	Beatrice, Whitegg
			3	obovata	Black King, Oria
			4	piriforme	Listada de Gandia
			5	clavata	Baluroi, Mileda, Solara
			6	ellipsoideale	Volta
			7	cilindrica	Mirabelle, Slim Purple, Tango
					
20	20 (b)	FRUTTO: taglia dell'attacco pistillare	1	molto piccolo	Whitegg
			3	piccolo	Baluroi
			5	medio	Bonica
			7	grande	Semi Redonda Negra
			9	molto grande	Purpura

N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE	VARIETA' DI RIFERIMENTO	
21	21 (b)	FRUTTO: apice	1	depresso	
			2	appiattito	Prosperosa
			3	arrotondato	Baluroi
			4	appuntito	Short Tom, Slim Purple
22	22 (b)	FRUTTO: profondità della depressione dell'attacco pistillare	1	assente o molto superficiale	
			3	superficiale	
			5	media	
			7	profonda	
23	23 (b)	SOLO VARIETA' CON FRUTTI CILINDRICI FRUTTO: curvatura	1	assente o molto debole	
			3	debole	
			5	media	
			7	forte	
24 GIBA	24 (*) (b)	FRUTTO: colore principale dell'epidermide a maturazione commerciale	1	bianco	Dourga
			2	verde	Kermit
			3	violetto	Baluroi, Purpura
25	25 (b)	SOLO VARIETA' CON EPIDERMIDE VERDE O VIOLETTA FRUTTO: intensità del colore principale dell'epidermide (come per 24)	1	molto chiaro	
			3	chiaro	Bride
			5	medio	Purpura
			7	scuro	
26	26 (b)	FRUTTO: brillantezza (come per car. 24)	3	debole	Short Tom
			5	media	Baluroi
			7	forte	Elisa
27	27 (b)	FRUTTO: chiazze	1	assenti	Baluroi
			9	presenti	Kermit

N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE		VARIETA' DI RIFERIMENTO
28 GIBA	28 (*)(b)	FRUTTO: striature	1	assenti	Baluroi
			9	presenti	Bandera
 <p>9</p>					
29	29 (b)	FRUTTO: importanza delle striature	3	debole	Bride
			5	media	
			7	forte	Bandera
30	30 (b)	FRUTTO: densità delle striature	3	sparse	
			5	medie	
			7	dense	Bandera
31 GIBA	31 (b)	FRUTTO: costolatura	1	assente o molto debole	Bonica, Reina Negra
			3	debole	Bibo
			5	media	Redonda Morada
			7	forte	Black Beauty
			9	molto forte	
32	32 (b)	FRUTTO: lunghezza del peduncolo	1	molto corto	Golden Eggs
			3	corto	Globo
			5	medio	Madonna
			7	lungo	Telar
			9	molto lungo	Adria, Avan
33 GIBA	33 (b)	FRUTTO: pigmentazione antocianica sotto il calice	1	assente	Pingtung Long, Ronde de Valence
			9	presente	Baluroi
34	34 (b)	FRUTTO: intensità della pigmentazione antocianica sotto il calice	3	debole	Short Tom
			5	media	Black Beauty
			7	forte	Baluroi
35	35 (b)	FRUTTO: taglia del calice	1	molto piccolo	Whiteegg
			3	piccolo	Dourga
			5	medio	Baluroi
			7	grande	Larga Morada
			9	molto grande	Solara
36 GIBA	36 (b)	FRUTTO: pigmentazione antocianica del calice	1	assente	Whiteegg
			9	presente	Short Tom
37	37 (b)	FRUTTO: intensità della pigmentazione antocianica del calice	1	molto debole	Dourga
			3	debole	Baluroi
			5	media	Mileda
			7	forte	De Barbentane
			9	molto forte	Ronde de Valence, Short Tom

N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE	VARIETA' DI RIFERIMENTO	
38 GIBA	38 (b)	FRUTTO: spinosità del calice	1	assente o molto debole	Freia
			3	debole	Bonica
			5	media	Baluroi
			7	forte	Bibo
			9	molto forte	
					
39	39 (b)	FRUTTO: increspatura del calice	1	molto debole	
			3	debole	Telar
			5	media	Bonica
			7	forte	Talina
			9	molto forte	Linda
40 GIBA	40 (*)(b)	FRUTTO: colore della polpa	1	biancastra	Dourga
			2	verdastra	Baluroi
41 GIBA	41/42 (b)	EPOCA DI INIZIO FIORITURA	3	precoce	Prelane
			5	media	Bonica
			7	tardiva	Monstrueuse de New York
<p><b>Note</b></p> <p>(a) <u>PIANTA E FOGLIE</u>: tutte le osservazioni vanno effettuate dopo l'inizio della fioritura della prima infiorescenza e prima dell' inizio della raccolta;</p> <p>(b) <u>FRUTTO</u>: tutte le osservazioni vanno effettuate sul primo frutto normalmente sviluppato.</p>					